

Cetirizin-ADGC®



Cetirizin-ADGC FİLM TABLET 10mg **Antihistaminik**

FARMAKOLOJİK ETKEN MADDE:

bir tablet Cetirizin-ADGC, etken madde olarak 10mg Cetirizindihidroklorid içerir.

DİĞER YARDIMCI MADDELER ŞUNLARDIR:

laktöz-monohidrat, mikrokristalin selüloz, silisyumdioksit mısır nişastası, magnezyumstearat, hipromeloz, makrogol 4000, titandiyoksit (E171 boya maddesi), sodyum sülfat 2 H₂O.

FARMASÖTİK ŞİRKET:

KSK-Pharma AG; Finkenstr.1; D-76327 Berghausen
Tel.: 0721- 20 19 0-0; Fax: 0721- 20 19 0-11

Olası riskler ve yan etkilerle ilgili olarak ilaç prospektüsünü okuyunuz ve doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

PAKET BÜYÜKLÜĞÜ TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI

20 film tablet (N1)	2,99 Euro
50 film tablet (N2)	7,00 Euro
100 film tablet (N3)	12,97 Euro

ENDİKASYONLARI:

Aşağıda sıralanmış olan alerjik hastalıklarda hastalık belirtilerinin (septomların) tedavisi için:

- kaşınma, şişkinlik oluşumu, ciltte kızarıklık gibi rahatsızlıklar ile birlikte görülen kronik örtiker (kurdeşen)
- kronik alerjik nezle; örneğin hapşırma, burun akması, burun kaşınması, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık ya da kaşınma ve gözyaşı akıntısı gibi şikayetlerle birlikte görülen saman nezlesi
- kronik alerjik nezlede (Urtikaria) görülen kaşınıntıda ve atopik dermatide (Neurodermatitis) görülen cilt kızarıklığı şikayetlerinde

Cetirizin-ADGC ALMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMEK ZORUNDASINIZ?

- Etken madde olan Cetirizindihidroklorid'e veya Cetirizin-ADGC'nin bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı olan aşırı duyarlılık
- (alerjik tepki) durumu rında kullanılmamalıdır.
- **Ağır böbrek hastalarının Cetirizin-ADGC'yi kullanmaları yasaktır.**
- Böbrek yetmezliği olan hastalar, tavsiye edilen dozun yarı miktarını almalıdırlar.
- Cetirizin-ADGC laktöz içerir. Bu nedenle ağır şeker hastası iseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- Gebelikte ve emzirme döneminde herhangi bir ilaç kullanmadan önce lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Cetirizin-ADGC'nin gebelik dönemi esnasında kullanımının güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle Cetirizin ADGC'nin kullanılması tavsiye edilmez. İlacın etken maddesinin anne sütüne geçiyor olmasından dolayı bu ilacı emzirme döneminde kullanmamalıdır.
- Bu ilacın 2 yaşın altındaki çocuk grubunda kullanımı için yeterli deneyimler bulunmadığından bu durumda ilacı sadece doktorunuza danışarak veriniz.

- Eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce kullandıysanız, reçetesiz ilaç olsalar dahi lütfen bu durumu doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
- Araştırmalarda ilacın alkolün etkisini arttırmadığı görülmüş de, Cetirizin-ADGC alkol ile birlikte alınmamalıdır.
- Kıyaslanabilir klinik araştırmalarda, tavsiye edilen dozda Cetirizin-ADGC'nin alımından sonra hastanın dikkati, reaksiyon yeteneği ve sürüş özelliklerinde herhangi bir etkilene meydana geldiği tespit edilmemiştir.
- Trafikte araç kullanan, emniyet önlemini almadan çalışan veya makine kullanan hastalara tavsiye edilen doz miktarını aşmamalarını ve ilaca karşı gösterecekleri kişisel reaksiyonu bekleme lütfen tavsiye ederiz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Cetirizin-ADGC'yi daima ilaç prospektüsündeki talimatlara uyarak kullanınız. Tam emin olmadığınız durumlarda lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde 12 yaş altındaki çocukların kullanması yasaktır. Yetişkinler için: günde bir film tablet. Eğer yetişkin seniz ve alerjiden dolayı astım hastasıysanız günde iki film tablet alabilirsiniz, tercihen 1 film tablet sabah ve 1 film tablet akşam.

2-12 yaş arasındaki çocuklar vücut ağırlıklarına uygun bir doz alırlar:

Vücut ağırlığı 30 kg veya daha az olanlar: yarım film tableti

Vücut ağırlığı 30 kg'dan fazla olanlar: 1 film tableti; bazı durumlarda tableti ikiye bölerek iki defada (yarım tablet sabah ve yarım tablet akşam) almak mümkündür.

- Cetirizin-ADGC öğünlerden bağımsız olarak alınabilir. Tablet çiğnenilmeden bir sıvı ile tercihen akşamları alınmalıdır.
- Tedavi süresi rahatsızlıkların türüne, süresine ve gidişatına göre değişir ve doktor tarafından belirlenir.
- Eğer Cetirizin-ADGC'nin etkisinin çok fazla ya da çok zayıf olduğu kanaatindeyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
- Cetirizin-ADGC'yi almayı unuttuysanız KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU başlığı altında belirtildiği gibi almaya devam ediniz. Bu durumda 2 katı şeklinde bir doz uygulamayınız.
- Almanız gerekenden daha büyük bir miktarda Cetirizin-ADGC aldıysanız lütfen doktorunuza haber veriniz. Kendisi alınacak önlemler konusunda kararlar alabilir.

Cetirizin-ADGC nasıl saklanmalıdır?

İlaçlar, çocukların erişemeyeceği bir şekilde saklanmalıdır. İlacı, blister ambalaj ve ilaç kutusu üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmanız yasaktır.

www.allergie-arznei.de
V01Z090908

Geçmiş olsun!